




BB S:t Göran



A close-up photograph of a newborn baby lying down. The baby is wearing a white knit hat and has their eyes closed. A hand is gently touching the baby's face. The text "Nollseparation" is overlaid on the image.

Nollseparation

Förutsättning för öppning av BB S:t Göran



Vårdfilosofi - våra värderingar är grunden

- Psykologisk trygghet och en trygg miljö
- Arbeta med helheten
- Kontinuitet
- En födande en barnmorska
- Två barnmorskor vid barnets framfödande
- Teamarbete , hela teamet lika viktigt
- Noll separation
- Informerat val och samtycke, vårdplaneringstavla



7 födelserum, universallrum, specialistmödravård och egna operationssalar, 23 eftervårdsplatser





FNs barnkonvention

Betonar att föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, och att barnet **inte ska skiljas från sina föräldrar**, om det inte är nödvändigt för barnets bästa

Patient lagen

Barnets föräldrar ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården om det är lämpligt




1/3 av Sveriges
neonatalavdelningar
använder metoden

Nollseparation

Innebär att förälder och barn separeras i så liten utsträckning som möjligt.

Vårdpersonalens strävan bör alltid vara att inte separera barnet från sin föräldern.

Barnets naturliga vårdplats vara i föräldrarnas famn



Hinder eller svårigheter med nollseparation

- Logistiska utmaningar
- Inställning och attityd
- Omvårdnadsrutiner som inte är anpassade

Så vad gör att BB St Göran kommer att lyckas med detta?

- Att skapa förutsättningar för nollseparation
- Att samarbeta mellan personalgrupper
- Att vårda familjen som en enhet



Mätbara effekter

Förbättrar reglering av fysiologiska parametrar hos det nyfödda barnet

- Underlättar stabilisering av puls
- Förbättrar syresättning
- Underlättar att vidmakthålla temperatur.
- Underlättar reglering av fysiologiska parametrar vilket i sin tur har betydelse för **sömn och stresshantering.**


Då sömn och stresshantering blir bättre så kan barnets energiresurser fokuseras på **tillväxt.**



För föräldrarna

- Ökad delaktighet för föräldrar samt starkare bindning till barnet.
- Kommer in i föräldrarollen snabbare
- Betydelsefullt för bindning och anknytning
- Nollseparation gör kritiska situationer mindre dramatiska vilket ger en ökad möjlighet till mer positiva upplevelser

Fetal circulation



Av fostrets
hjärtminutvolym


- 40% till placenta
- 8% till lungorna
- 52% till kroppen

Neonatal transfusion


Med intakt navelsträng

Blodet i placenta och navelsträng får tid att flytta in i det "tomma" lungkretsloppet


I genomsnitt 110 ml högre blodvolym hos barnet




'Placentatransfusion vid återupplivning'




'Placentatransfusion vid återupplivning'





Hypotesen: 'Placentatransfusion vid återupplivning'




















1. Sectio enligt sedvanlig rutin förutom nedanstående punkter.
2. Antibiotika ges pre/peroperativt som profylax alt som behandling vb.
3. Sedvanligt framförskaffande av barnet som läggs på mammans lår och bedöms av barnmorska
4. Vid behov av återupplivning lyfts barnet över till life start av barnmorska.
5. Undvik spänning/drag i navelsträngen.
6. Navelsträngsprover (ven och artär) tas i operationssåret av operatör eller annan lämplig person direkt (inom 1 min) när barnet är ute och innan klampning.
7. När barnet är framfött uppskattas blödningsmängden varje minut (vid 1 min, 2, 3 etc). Mängden blödning uttalas högt i rummet av t ex av op usk.
8. Oxytocin 8,3 ug ges iv direkt när barnet är ute, 1 IE/min (konc 0,83ug/ml) under

9. Vid riklig blödning sätts peanger direkt i uterotomin och ev appliceras även hörnsuturer.
10. Vid pågående maternell blödning >500 ml rekommenderas avnavling och att exprimera/lösa placenta.
11. Vid misstanke om pågående fetal blödning görs avnavling omgående (vasa previa blödning, om fetal blödning misstänks i fall av ablatio eller om du har behövt gå igenom placenta).
12. Kommunícera tydligt när navelsträngen klampas.
13. När barnet är avnavlat, exprimeras/löses placenta och operationen avslutas enligt rutin

Streamio - Succes Översikt v1.mp4



Cambio

S:t Görans Sjukhus